

FOLHETO INFORMATIVO

Lifo-Scrub®

Distribuidor:

B. Braun Medical Lda.,
Estrada Consiglieri Pedroso,
80, Queluz de Baixo,
2730-053 Barcarena

Fabricante:

B. Braun Medical AG
CH-6204 Sempach

Composição: [g/100 g] Solução de digluconato de Clorohexidina (eq. a Digluconato de Clorohexidina) 21.28 g (4.0 g /100 g), Óxido de Lauramina, Miristil Glicol 60- Cetearato, Álcool isopropílico, Essência de Oil Biancaflor PH 799 979, PM Vermelho Ponceau 4R (Cl. No. 16255, E 124), Delta-Gluconolactona (E 575), Hidróxido de sódio, Água Purificada
UFI: JOEV-Q7VT-W00G-T09Y

Solução tópica, não inflamável, para aplicação na pele.

Utilização do produto: Desinfecção da pele intacta em caso de:

- Desinfecção higiénica e cirúrgica das mãos.

- Limpeza anti-séptica da pele

Posologia e Modo de Utilização: Desinfecção higiénica das mãos:

Molhar as mãos em água. Esfregar as mãos, durante 1 minuto, com 5 ml de Lifo-Scrub®. Em seguida, voltar a passar as mãos por água e secá-las.

Para utilização profissional.

Desinfecção cirúrgica das mãos:

Molhar as mãos e os antebraços com água. Esfregá-los, durante 1 minuto, com 5 ml de Lifo-Scrub®. Enxaguar e lavar novamente com mais 5 ml de Lifo-Scrub®, durante 2 minutos. Em seguida enxaguar novamente e secar.

Limpeza anti-séptica da pele:

Durante o banho ou duche, lavar todo o corpo, utilizando o Lifo-Scrub® como qualquer outra loção de banho (no duche o Lifo-Scrub® deverá actuar durante um curto espaço de tempo antes de se enxaguar), ou molhar a região que foi submetida a intervenção cirúrgica e lavar com Lifo-Scrub® durante 2 minutos, enxaguando e secando em seguida.

Os doentes acamados poderão ser lavados com Lifo-Scrub®, utilizando uma técnica padrão de lavagem na cama.

Esta limpeza constitui apenas um procedimento higiénico de apoio. Não pode substituir a desinfecção convencional da pele, ou seja, não pode substituir a desinfecção pré-cirúrgica do campo cirúrgico.

Contra-indicações: Sensibilidade conhecida à cloro-hexidina ou a qualquer um dos outros excipientes.

Evitar o contacto directo com os olhos, tecido cerebral, meninges ou ouvido médio. Em caso de contacto inadvertido com os olhos, deverá proceder-se de imediato a lavagem abundante com água.

Precauções e precauções de Uso: No caso de doentes com ferimentos no crânio ou na zona da coluna vertebral ou no caso de tímpano perfurado, o benefício da limpeza anti-séptica deve ser considerado em relação com o risco do contacto.

Evitar o contacto com os olhos: Utilizar apenas em áreas bem arejadas

Interações medicamentosas e outras formas de interacção

O uso simultâneo de Lifo-Scrub® e sabão ou outros agentes aniónicos reduz a eficácia da cloro-hexidina.

Gravidez e lactação: A cloro-hexidina é fracamente absorvida percutaneamente, concluindo-se que o Lifo-Scrub® pode ser utilizado, do modo recomendado, para a desinfecção das mãos. O Lifo-Scrub® não deve ser utilizado na desinfecção dos seios de mulheres em fase de lactação, uma vez que não se encontram disponíveis estudos controlados sobre o uso de cloro-hexidina na gravidez e lactação, não devendo igualmente ser utilizado para a limpeza de todo o corpo.

Efeitos indesejáveis: Ocasionalmente, poderão surgir reacções de pele irritada.

Foram descritos casos isolados de reacções generalizadas provocadas pela cloro-hexidina.

Sobredosagem

Devido aos agentes detergentes que entram na composição desta solução, a ingestão accidental de Lifo-Scrub® envolve o grave risco de sufocação por aspiração de espuma.

Ingestão oral:

Não provoque o vômito. Consulte um médico. Em caso de vômito é necessário ter em atenção risco de sufocação por aspiração de espuma. Lavar a boca com água abundante. Ingerir água em abundância para diluir o produto (ou se possível suspensão de carvão). A decisão sobre indução do vômito deve ser efectuada pelo clínico.

Tratamento:

Quando ingerida oralmente, a cloro-hexidina é fracamente absorvida. No entanto, já foi descrita hemólise após ingestão ou administração IV accidentais.

No caso de ingestão accidental, deve proceder-se a lavagem gástrica utilizando agentes demulcentes: leite, ovo cru, gelatina ou sabão suave com acção anti-espuma.

No caso de hemólise, pode ser necessária transfusão sanguínea. Caso seja necessário, recorrer a medidas de apoio.

Contacto com os olhos.

O contacto com os olhos pode acarretar o risco de danos sérios nos mesmos. Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras durante 15 minutos pelo menos.

Se a irritação dos olhos persistir, deve consultar imediatamente um especialista.

Tipo de embalagem

Embalagem primária (interna):

Embalagens de plástico (polietileno com tampa com fecho de segurança e de inviolabilidade também em plástico), com um volume de 100 ml, 500 ml, 1 000 ml e 5000 ml.

Rótulo nas duas faces. Rótulo autocolante de película plastificada

Embalagem secundária (externa):

Para todos os volumes:

Embalagem de 20 unidades em cartão contendo um Folheto Informativo em papel, incluso.

Para o volume de 5000 ml:

Embalagem de venda unitária com embalagem exterior em cartão e com Folheto Informativo em papel, incluso.

Conteúdo líquido das embalagens

Apresentações

20 Frascos de 100 ml

20 Frascos de 500 ml

10 Frascos de 1000 ml

1 Frasco de 5000 ml

B | BRAUN

Distribuidor:

B. Braun Medical, Lda.

Est. Consiglieri Pedroso, 80

Queluz de Baixo

2730-053 Barcarena